

# Damier de la succise

## *Euphydryas aurinia*



Collectif  
Garrigues  
vivantes

### Description / Biotope

Les **ailes** sont de couleur générale **orangée à dessins noirs**, présentant une alternance de **taches et bandes orangées-rouges à jaunes** sur la face supérieure. Sur l'aile postérieure, une **bande orange vif à points noirs** est notable. Mâles et femelles sont **semblables**.

Il est visible de **mars à août** selon les **milieux variés** qu'il fréquente : de secs à humides, prairies, landes, pelouses sèches, tourbières...

### Le Saviez-vous ?

Les mâles de cette espèce sont généralement territoriaux. Ils guettent les femelles et rivaux sur leur territoire.



### Biologie / Comportement

Les chenilles se développent sur les **Scabieuses, Chèvrefeuilles, Gentianes**.

En **garrigues**, la plante hôte est principalement la **Céphalaire blanche**.

Elles passent l'hiver **en groupe** dans un **nid de soie au pied de la plante**. Elles sont très sensibles au parasitisme, ce qui induit une forte **variabilité d'abondance** d'une année à l'autre.



### Menace / Situation locale

Causes de la **régression** :

- La **destruction**, la **fragmentation** et la **fermeture** des milieux qu'elle affectionne.

De plus, elle est assez **sédentaire**, ce qui ne lui permet pas de coloniser facilement de nouveaux sites.

C'est une espèce **menacée**, en **forte régression**.

Elle est **protégée en France**, et bénéficie du PNA (Plan National d'Action) en faveur des papillons de jour, visant à enrayer les causes directes de leur disparition.

### Evaluation Liste Rouge IUCN

Risque de disparition de l'espèce à l'échelle régionale

AuRA

LC


NT

VU

EN

CR

LC préoccupation mineure, NT quasi menacée, VU vulnérable, EN en danger, CR en danger critique



ouyon

©H. Bouyon